

تعميم رقم 61
تعريف حالات عدوى بالمكورات البنيّة أو السيلان
Gonorrhea / Gonococcie

رقم المحفوظات: 1/202-1/1
بيروت في 14 نيسان 2007

يعتمد التعريف التالي لحالات السيلان أو عدوى بالمكورات البنيّة، الواجب الإبلاغ عنها الى وزارة الصحة العامة :

الحالة المثبتة Cas confirmé Confirmed case	شخص يظهر:
	<p>- سريريا: مرض منقول جنسيا، عادة على شكل التهاب الاحليل، التهاب عنق الرحم، أو التهاب البوق. قد يحدث في مواضع أخرى من المسالك البولية التناسلية، أو البلعومية أو الشرجية. وقد يكون عديم الاعراض. - ومخبريا، إيجابية إحدى الفحوصات التالية: وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام ونموذجية، إيجابية الاكسيداز في عينات سريرية؛ أو وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام داخل الخلايا في لطخات من احليل الذكر؛ أو إيجابية الزرع للمكورات البنيّة على مستنبتات خاصة (مستنبت تاير - مارتن المعدل أو مستنبت نيويورك سيتي)؛ أو إيجابية اختبار الكشف عن المستضدات او الحمض النووي للمكورات البنيّة في عينات سريرية.</p> <p style="text-align: center;">- - -</p> <p>Un cas présentant :</p> <ul style="list-style-type: none">- Cliniquement : une infection sexuellement transmissible, se manifestant habituellement par une uréthrite, une cervicite ou une salpingite. L'infection peut affecter d'autres sites du tractus urogénital, l'oropharynx, le rectum. L'infection peut être aussi asymptomatique.- Et une confirmation de laboratoire :• Observation de diplocoques Gram-négatifs typiques, oxidase-positifs à partir de prélèvement clinique ;• Ou observation de diplocoques Gram-négatifs intracellulaires à partir d'un prélèvement urétral chez l'homme ;• Ou culture bacteriologique positive de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> sur milieu sélectif (milieu Thayer-Martin modifié MTM ou milieu New York City NYC) ;• Ou détection d'antigènes ou de matériel d'acide nucléaire de <i>Neisseria gonorrhoeae</i> à partir d'un prélèvement clinique. <p style="text-align: center;">- - -</p> <p>A case presenting with:</p> <ul style="list-style-type: none">- Clinically: a sexually transmitted infection commonly manifested by urethritis, cervicitis or salpingitis. Other sites can be affected of the urogenital tract, oropharynx, rectum. Infection may be asymptomatic.- And laboratory confirmation:• Observation of typical Gram-negative, oxidase-positive diplococci from a clinical specimen;• Or observation of Gram-negative intracellular diplococci in a urethral smear obtained from a male;• Or positive bacteriological culture on selective media (modified Thayer-Martin MTM or New York City NYC);• Or detection of antigen or nucleic acid-based of <i>Neisseria gonorrhoeae</i> in a clinical specimen.

<p>وجود مكورات مزدوجة سلبية الغرام داخل الخلايا في لطخات من عنق الرحم عند المرأة.</p> <p style="text-align: center;">- - -</p> <p>Observation de diplocoques Gram-négatifs intracellulaires à partir d'un prélèvement endocervical chez la femme.</p> <p style="text-align: center;">- - -</p> <p>Observation of gram-negative intracellular diplococci in an endocervical smear obtained from a female.</p>	<p>الحالة المحتملة Cas probable Probable case</p>
<p style="text-align: right;">A54</p>	<p>رمز المرض ICD-10 / CIM-10</p>

مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمّار

يبلغ:
مديرية الوقاية الصحية
مصلحة الطب الوقائي
وحدة الترصد الوبائي
مصالح الصحة في المحافظات
أقسام الصحة في الاقضية
نقابيّي أطباء في لبنان والشمال
نقابة المستشفيات الخاصة
المحفوظات
website